

大腸X線検査を受けられる患者様へ

(肛門からバリウムと空気を入れて大腸のX線写真を撮る検査です)

月 日 (曜日) 時 分に受付してください。

- 正確な良い検査が受けられるように、下記の処置を正しく行ってください。
- それぞれの項目を正しく実行した後、確認欄に○印をつけ検査当日にご持参ください。
- 検査食は院内コンビニで購入できます。

		指示事項	確認
検査3日前 (/)		<u>下剤①</u>	
検査2日前 (/)		白い錠剤 2錠(ビロフィルナ)を午後9時に飲んでください。	
検査前日 (/)	午前8時	朝食：消化の良い食事または検査食を食べてください。	
	正午	昼食：消化の良い食事または検査食を食べてください。	
	午後2時	コップ1杯(200ml)以上の水分をお飲みください。	
	午後3時	間食：消化の良い食事または検査食を食べてください。	
	午後4時	コップ1杯(200ml)以上の水分をお飲みください。	
	午後6時	夕食：消化の良い食事または検査食を食べてください。	
	午後7時	コップ1杯(200ml)以上の水分をお飲みください。	
	午後8時	<u>下剤②</u> 液体の下剤(マグロール250ml)をお飲みください。 ※冷蔵庫での保管は避けて下さい。	
	午後10時	<u>下剤③</u> 赤い錠剤 2錠(セノバド)と白い錠剤 1錠(ビロフィルナ)をコップ1杯の水でお飲みください。	
検査当日(/) 午前7時		朝食は食べずに、砂糖入りの紅茶・スポーツドリンク等をお飲みください。 <u>※常備薬はお飲みください。ただし、糖尿病の薬は飲まないでください。</u>	

消化の良いお食事の例・飲食できるもの	飲食できないもの
おかゆ(塩味)、豆腐(薬味なし)、味噌汁(汁のみ)、食パン、具の入っていないスープ、うどん・そば(麺と汁のみ)、バナナ、練り梅、はちみつ、水、お茶、スポーツドリンク、透明なジュース、砂糖入りの紅茶、サイダー、コーラ、氷砂糖、透明な飴玉	野菜、きのこ類、海草類、こんにゃく、種のある果物

※水の飲み方が少ないと下剤が効きませんので、出来るだけ多めに水を飲んでください。

※水のような下痢便が出るのが普通です。下剤のためですので心配ありません。出来るだけ十分に排便してください。

※不明な点は当院外来へお問い合わせください。(月～金の14時～17時)

検査費用のめやす

宗像医師会病院 TEL 0940-37-1188

	1割負担	3割負担
大腸X線検査	2250円	6750円

説明者	
-----	--

※この用紙は宗像医師会病院のホームページからダウンロード出来ます (14.04改定)